

**ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
(SALICYLIC ACID)**

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: salicylic acid;

1 мл розчину містить саліцилової кислоти 0,01 г або 0,02 г;

допоміжна речовина: етанол 70%.

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування спиртовий (1 % або 2 %).

Прозора безбарвна рідина із запахом спирту.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ “Тернопільська фармацевтична фабрика” або ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група.

Дерматологічні засоби.

Код ATC D01A E12.

Фармакологічні властивості. Антисептичний засіб. При місцевому застосуванні чинить протимікробну, подразнювальну, відволікачу дію.

Показання для застосування.

Застосовують при інфекційних ураженнях шкіри: звичайних вуграх, піодермії.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не допускати потрапляння препарату в очі, не наносити на слизові оболонки.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити Вашому здоров'ю.

Особливі застереження.

Не слід застосовувати препарат при вагітності та годуванні груддю, а також наносити на велике ділянки шкіри.

Досвід застосування у дітей відсутній.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують зовнішньо, змащуючи або розтираючи уражені ділянки шкіри ватним тампоном, просоченим препаратом, 2-3 рази на добу. Курс лікування визначає лікар залежно від перебігу та тяжкості захворювання.

Передозування.

При застосуванні великих доз препарату може посилитися кератолітична дія та алергічні реакції. У такому разі препарат необхідно змити водою, звернутися за консультацією до лікаря. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

В окремих випадках можливі алергічні прояви, симптоми подразнення шкіри (кропив'янка, печіння, свербіж).

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що невідома.

Якщо Ви приймаете будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це лікарю.

Термін придатності.

3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

Умови зберігання.

Зберігати в захищенному від світла місці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 40 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецептa.