

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
САЛЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ
(SALICYLIC ACID ALCOHOLIC SOLUTION)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: salicylic acid;

1 мл розчину містить саліцилової кислоти 0,01 г (10 мг);

допоміжна речовина: спирт етиловий 70%.

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування спиртовий.

Прозора безбарвна рідина з спиртовим запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Фітофарм".

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Дерматологічні засоби.

Код АТС D01A E12.

Фармакологічні властивості. Антисептичний засіб. При місцевому застосуванні чинить протимікробну, подразнювальну, відволікаючу дію.

Показання для застосування.

Застосовують при інфекційних ураженнях шкіри: звичайних вуграх, піодермії.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не допускати потрапляння препарату в очі, не наносити на слизові оболонки.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити Вашому здоров'ю.

Особливі застереження.

Не слід застосовувати препарат при вагітності та годуванні груддю, а також наносити на великі ділянки шкіри.

Досвід застосування у дітей відсутній.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують зовнішньо, змашуючи або розтираючи уражені ділянки шкіри ватним тампоном, просоченим препаратом, 2-3 рази на добу. Курс лікування визначає лікар залежно від перебігу та тяжкості захворювання.

Передозування.

При застосуванні великих доз препарату може посилитися кератолітична дія та алергічні реакції. У такому разі препарат необхідно змити водою, звернутися за консультацією до лікаря. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

В окремих випадках можливі алергічні прояви, симптоми подразнення шкіри (кропив'янка, печіння, свербіж).

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря !

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що невідома.

Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це лікаря.

Термін придатності.

3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 40 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.