

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
САЛІЦИЛОВО-ЦИНКОВА ПАСТА
(PASTA ZINCI-SALICYLATA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г пасту містить кислоти саліцилової 0,02 г, цинку оксиду 0,25 г;
допоміжні речовини: крохмаль картопляний, парафін білий м'який.

Лікарська форма. Паста.

Однорідна маса білого кольору з жовтим відтінком.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика» або ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні засоби. Препарати з пом'якшувальною і захисною дією. Препарати саліцилової кислоти. Код АТХ D02A F.

Фармакологічні властивості. Комбінований препарат для зовнішнього застосування, дія якого обумовлена лікувальними властивостями складових частин препарату. Саліцилова кислота має протизапальну, антисептичну і помірну місцевопоздрознювальну дію. Цинк виявляє слабку протимікробну, в'язучу, адсорбуючу дію, підсушує шкіру, що призводить до зменшення ексудації і сприяє зменшенню місцевих проявів запалення і подразнення. При зовнішньому застосуванні цинково-саліцилова паста практично не абсорбується в системний кровотік і не проявляє резорбтивної дії.

Показання для застосування. Пiodермія, екзема, дерматит, виразки шкірних покривів з перевагою процесу ексудації, попрілості, вугровий висип, іхтіоз, дискератози.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гострі гнійні захворювання шкіри і прилеглих тканин.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Не слід допускати потрапляння пасту в очі і в рани! Якщо паста випадково потрапила в очі, слід ретельно промити їх великою кількістю проточної води.

Не рекомендується застосовувати пасту на ділянки шкіри, які дуже мокнуть, а також при надмірній її сухості.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітним жінкам та в період годування груддю застосування препарату не рекомендується.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Не впливає.

Діти

Досвід застосування препарату у дітей відсутній, тому пасту не рекомендується для застосування у дітей.

Спосіб застосування та дози. Застосовують дорослим зовнішньо. Пасту наносять у вигляді аплікацій на уражені ділянки шкіри 1 – 2 рази на день.

Тривалість курсу лікування визначається залежно від характеру захворювання і становить приблизно від 6 до 20 днів.

Передозування. При нанесенні на значні ділянки шкірного покриву на тривалий час можливе посилення алергічної реакції.

У цьому разі хворому слід припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.

Побічні ефекти. Алергічні реакції (свербіж, печіння), подразнення шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не вивчалася.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 г у банках, по 25 г у тубах.

Категорія відпуску. Без рецепта.