

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ШИПШИНИ ПЛОДИ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: плоди шипшини.

Лікарська форма. Плоди.

Висушені плоди шипшини травневої або коричневої, від оранжево-червоного до бурувато-червоного кольору, із кислувато-солодким в'язучим смаком, без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фітолік».

Україна, 76026, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 183, корп. 1.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси.

Код АТС А16А Х10**.

Фармакологічні властивості. Плоди шипшини травневої, коричневої (*Rosa majalis* *Herm.*, *R. cinnamomea* *L.*) та інших видів містять аскорбінову кислоту (не менше 0,2 %), каротин, вітаміни В₁, В₂, РР, К, пантотенову кислоту, флавоноїди, фенольні та органічні кислоти, пектини, цукри, солі заліза, марганець, фосфор, магній, кальцій.

Препарати шипшини активізують ферментні системи та окисно-відновні процеси, сприяють зменшенню проникності капілярів, нормалізують вуглеводний обмін, посилюють синтез гормонів і регенерацію тканин, чинять антисклеротичну, протизапальну, жовчогінну та сечогінну дію, підвищують опірність організму до несприятливих факторів навколишнього середовища.

Показання для застосування.

Загальнозміцнюючий засіб при гострих та хронічних інфекціях, дистрофії, фізичних навантаженнях; геморагічні діатези, різні кровотечі, передозування антикоагулянтів; гострі та хронічні захворювання печінки (хронічний гепатит, холецистит, холангіт); хвороби нирок і сечового міхура (нефрити, нефропатії у вагітних).

Протипоказання.

Тромбофлебіт і схильність до нього. Індивідуальна непереносимість біологічно активних речовин, що містяться в лікарському засобі.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Тривалий безконтрольний прийом препаратів з аскорбіною кислотою може призвести до розвитку цукрового діабету, ураження нирок, артеріальної гіпертензії.

Настій приймають у теплого вигляді після їди. Хворим на цукровий діабет, артеріальну гіпертензію та захворювання нирок препарати шипшини призначають з особливою обережністю, під наглядом лікаря.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає протипоказань.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими

механізмами.

Не впливає.

Діти.

Дітям віком до 1 року не слід застосовувати Шипшини плоди.

Спосіб застосування та дози.

10 г (1 столова ложка) плодів вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 - 60 хвилин, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі і діти старше 12 років приймають у теплому вигляді по ½ склянки 2 рази на день після їди. Діти, залежно від віку – від 2 столових ложок до 1/3 склянки 2 рази на день після їди.

Дітям віком від 1 до 2 років – по 3 чайних ложки (15 мл), від 2 до 4 років – по 2 десертних ложки (20 мл), від 4 до 7 років – по 3 десертних ложки (30 мл), від 7 до 12 – по 1/3 склянки 2 рази на день.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату, в середньому 15 - 30 днів.

З метою профілактики препарат приймають 1 раз на добу.

Передозування.

Поява або посилення алергічних реакцій. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливий розвиток алергічних реакцій (свербіж, гіперемія, набрякання шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому місці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 г у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску.

Без рецепта.