

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**СПИРТ КАМФОРНИЙ**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* камфора рацемічна;  
100 мл розчину містять камфори рацемічної 10 г;  
*допоміжна речовина:* етанол 70 %.

**Лікарська форма.**

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10 %.

Прозора безбарвна рідина зі специфічним запахом камфори.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика», або ТОВ «Тернофарм».  
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТС M02A X10.

Препарат чинить протимікробну, знеболувальну, протизапальну, подразнювальну дію.

**Показання для застосування.**

Зовнішньо - при запальних процесах (артрит, міозит, артралгія, міалгія, ішіас), для запобігання пролежням.

**Противоказання.**

Препарат протипоказаний при виразково-некротичних захворюваннях шкіри, підвищеній індивідуальній чутливості.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Не допускати потрапляння препарату в очі.

Не допускати потрапляння препарату на слизові оболонки. При випадковому потрапленні слід змити препарат великою кількістю проточної води.

**Особливі застереження.**

*Застосування в період вагітності або годування груддю.*

Доцільність застосування препарату вирішує лікар з урахуванням співвідношення користь/ризик.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

**Діти.**

Досвід застосування у дітей відсутній, тому препарат не показаний для застосування в педіатричній практиці.

**Спосіб застосування та дози.**

Камфорний спирт застосовують у дорослих зовнішньо для розтирань при наведених патологічних процесах. Розтирають шкіру 2 - 3 рази на добу.

Тривалість лікування визначається індивідуально.

**Передозування.**

Випадків передозування не спостерігалось.

**Побічні ефекти.**

В окремих випадках можливі алергічні прояви, кропив'янка.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не виявлена.

**Термін придатності.**

5 років.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Умови зберігання.** Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 40 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.