

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ШАВЛІЇ ЛИСТЯ
(FOLIA SALVIAE)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 пачка містить шавлії листя 50 г.

Лікарська форма. Листя.

Шматочки листків різної форми і цілі листки розміром від 1 до 35 мм з невеликою кількістю інших частин рослини (шматочки стебел, квіток з квітконіжками і без них).

Поверхня листків рівномірно-зморшкувата або дрібночарункова з густою мережею жилок, які сильно вдавлені зверху і виступають знизу; вкрита довгими волосками, особливо з нижнього боку. Край листка дрібнозарубчастий. Шматочки стебел чотиригранні, опушені; квітки з двогубою опушеною чашечкою і двогубим синьо-фіолетовим віночком.

Колір листків зелений, сірувато-зелений або сріблясто-білий. Запах своєрідний, ароматний. Смак гіркувато-пряний, злегка в'язучий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Лубнифарм».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для застосування в стоматології. Код АТС А01А D11.

Шавлії листя містять олію ефірну, речовини дубильні конденсовані, кислоти тритерпенові (урсолова і олеанолова), дитерпени, речовини смолисті і гіркі, флавоноїди, кумарин ескулетин та інші речовини. Цей комплекс біологічно активних речовин має в'язучу, протизапальну, дезінфікуючу, відхаркувальну, гіпоглікемічну дію. Препарати із шавлії листя ущільнюють епітеліальні тканини, знижують проникність клітин-них мембран, діють кровоспинно за рахунок зміцнення стінок ушкоджених кровоносних судин, мають антисептичну дію, зменшують потовиділення, підвищують секреторну функцію шлунково-кишкового тракту.

Показання для застосування.

Зовнішньо у вигляді настою застосовують при захворюваннях ротової порожнини і верхніх дихальних шляхів (стоматити, гінгівіти, пародонтози, ларингіти, фарингіти, трахеїти).

Протипоказання.

Індивідуальна чутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарському засобі.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Відсутні.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та клінічна ефективність препарату при вагітності та в період годування груддю не вивчалась, тому перш ніж застосовувати препарат, слід проконсультуватися з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

механізмами.

Не впливає.

Діти.

Безпека та ефективність застосування Шавлії листя у дітей не встановлені, тому не рекомендується без призначення лікаря застосовувати препарат дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують у вигляді настою: 5 г (1 столову ложку) листя поміщають в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. Зовнішньо застосовують для інгаляцій та полоскань 3 - 4 рази на день.

Тривалість лікування визначається лікарем і залежить від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.

Передозування.

Не встановлено.

Побічні ефекти.

При індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можливий розвиток алергічних реакцій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності.

1 рік 6 місяців.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла та вологості місці при температурі від 15 °С до 25 °С. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 50 г у пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.