

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
БОРОМЕНТОЛ

Склад лікарського засобу.

Діючі речовини: 100 г мазі містить: кислоти борної – 5 г, ментолу - 0,5 г;
допоміжна речовина: парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь білого або світло-жовтого кольору, з характерним запахом;

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"
або ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Фармакотерапевтична група. Засіб, що діє на чутливі нервові закінчення. Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа. Код АТС R01A X30.

Комбінований препарат для місцевого застосування. Чинить антисептичну і знеболювальну дію. При зовнішньому застосуванні бороментол практично не абсорбується у системний кровотік.

Показання для застосування. Свербіж шкіри, невралгії, риніт.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, тяжкі порушення функції нирок, вагітність, дитячий вік до 3 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Препарат призначений лише для зовнішнього застосування. Уникати потрапляння препарату в очі!

Особливі застереження. Не наносять на слизову оболонку носа.

Застосування у період вагітності та годування груддю. Препарат протипоказаний у період вагітності. Під час годування груддю застосовують за умови, коли очікувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти. Протипоказаний дітям віком до 3 років. У цьому віці можлива рефлекторна зупинка дихання.

Спосіб застосування та дози. Мазь наносять у невеликих кількостях на уражені ділянки шкіри, при риніті – на шкіру крил носа та легко втирають. Частота нанесення та тривалість застосування залежить від досягнутого ефекту та переносимості препарату.

Передозування. Не описане.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, контактний дерматит. При нанесенні на великі ділянки шкіри можливі блювота, діарея, головний біль, сплутаність свідомості, ниркова недостатність.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не виявлена.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 25 г в банках, тубах.

Категорія відпуску. Без рецепта.