

ІНСТРУКЦІЯ**для медичного застосування препарату
ВАЛОКОРМІД****Склад лікарського засобу.**

Діючі речовини: 1 мл препарату містить валеріани настойки – 0,33 мл, конвалії настойки – 0,33 мл, беладонни (красавки) настойки – 0,17 мл, натрію броміду – 0,13 г, ментолу - 0,0083 г;

допоміжна речовина: вода очищена, етанол.

Лікарська форма. Краплі.

Рідина червонувато-бурого кольору, з запахом валеріани та ментолу.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"

або ТОВ «Тернофарм.

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>

Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні засоби. Код АТС N05C M09.

Комбінований препарат рослинного походження, який чинить седативну та спазмолітичну дію.

Показання для застосування. Серцево-судинні неврози, що супроводжуються брадикардією.

Протипоказання. Глаукома, органічні ураження серця, судин, гіпертрофія передміхурової залози, захворювання нирок, підвищена чутливість до препарату, вагітність, період годування груддю, дитячий вік.

Особливі застереження.

- *Застосування у період вагітності та годування груддю.* Через те, що препарат містить спирт етиловий, його не можна призначати вагітним та жінкам, які годують груддю.

- *Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* У період лікування слід утримуватися від керування автомобілем і виконання роботи, що потребують підвищеної уваги та швидкої реакції.

- *Діти.* Досвіду застосування у дітей немає.

Спосіб застосування та дози. Застосовують дорослим. Приймають внутрішньо по 10 - 20 крапель 2 - 3 рази на день до їди. Тривалість приймання залежить від характеру захворювання, досягнутого терапевтичного ефекту та переносимості препарату.

Передозування. Сухість у роті, спрага, головний біль, запаморочення, сонливість, слабкість, біль у животі, порушення зору, серцебиття.

Побічні ефекти. Можливе пригнічення емоційних реакцій, сонливість, прояви індивідуальної гіперчутливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Потенціює дію седативних, снодійних та спазмолітичних засобів.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 25 мл у флаконах-крапельницях або флаконах полімерних, по 30 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.