

ІНСТРУКЦІЯ**для медичного застосування препарату
ЗЕЛЕНІНА КРАПЛІ****Склад лікарського засобу:**

діючі речовини: 1 флакон містить красавки настойки (1:10) - 5 мл; конвалії настойки (1:10) - 10 мл; валеріани настойки (1:5) - 10 мл ментолу - 0,2 г;

допоміжні речовини: етанол.

Лікарська форма. Краплі.

Рідина зеленуватого або жовто-бурого кольору з характерним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"

або ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Фармакотерапевтична група. Різні комбіновані кардіологічні препарати.

Код АТС С01Е Х.

Комбінований препарат рослинного походження. Компоненти настоек зменшують збудливість центральної нервової системи, чинять спазмолітичну дію, незначний кардіотонічний ефект, збільшують частоту серцевих скорочень.

Валеріанова кислота обумовлює заспокійливу дію на центральну нервову систему. Настойка беладони блокує М-холінорецептори гладких м'язів внутрішніх органів і спричиняє спазмолітичну дію. Ментол, подразнюючи слизову оболонку ротової порожнини, рефлекторно розширює коронарні судини.

Показання для застосування. Нейроциркуляторна дистонія, брадикардія.

Протипоказання. Глаукома, органічні ураження серця і судин, гіпертрофія передміхурової залози, індивідуальна непереносимість препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Особам літнього віку краплі Зеленіна призначають з обережністю через вміст у препараті настойки беладони.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності та годування груддю. Не застосовувати препарат в періоди вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти. Не застосовувати дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози. Застосовують внутрішньо. Дорослим та дітям від 12 років призначають по 20 - 25 крапель препарату 2 - 3 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту.

Передозування. Можливі сухість у роті, головний біль, запаморочення, сонливість, нудота, порушення зору, серцебиття. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти. Тахікардія, сухість у роті, спрага, порушення зору, гіпертермія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Краплі Зеленіна зменшують дію антиаритмічних засобів, що призначають при тахікардії, судинних розладах, а також спазмолітичних засобів.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 мл у флаконах-крапельниках.

Категорія відпуску. Без рецепта.