

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КАМФОРНА ОЛІЯ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 мл рідини містить 0,1 г камфори;

допоміжна речовина: олія соняшникова рафінована.

Лікарська форма. Олія для зовнішнього застосування.

Прозора оліста рідина жовтого кольору із характерним запахом камфори.

Назва і місцезнаходження виробника.

Державне підприємство “Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України”.

Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15а.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовують місцево при суглобовому та м'язовому болю. Код АТС M02A X10.

Камфорна олія при місцевому застосуванні чинить протимікробну, протизапальну, відволікаючу, знеболювальну дію та усуває свербіж шкіри.

Ці властивості зумовлені наявністю в молекулі камфори функціонально активної молекули кисню, яка має високий окиснювальний потенціал, порушує клітинні мембрани мікроорганізмів, руйнує багато активних сполук, що спричинюють запалення, біль і подразнення чутливих рецепторів шкіри.

Показання для застосування. Призначають при ревматизмі, артритах, артралгії, міозитах, міалгії, ішіасі, шкірному свербіжі.

Протипоказання. Захворювання шкіри різного характеру в місці застосування препарату. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю. Застосовується з урахуванням співвідношення користь для жінки/ризик для плода (дитини), яке визначає лікар.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не досліджувалася.

Діти. Не застосовують дітям через відсутність клінічного досвіду.

Спосіб застосування та дози. Камфорну олію застосовують зовнішньо дорослим як самостійно, так і в комбінації з метилсаліцилатом, скипидаром та іншими лікарськими засобами для місцевого застосування.

Застосовують зовнішньо для розтирання і компресів при зазначених патологічних процесах. Спосіб застосування, кількість аплікацій, тривалість однієї аплікації зумовлені характером захворювання, його вираженістю, характером супутньої терапії.

Передозування. Не можливе.

Побічні ефекти. В окремих випадках може спричинювати алергічні прояви у вигляді кро-пив'янки та подразнення шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Взаємодія поки що не відома.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 30 мл у скляних флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.