

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**СПИРТ МУРАШИНИЙ**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 100 мл розчину містять кислоти мурашиної 1,4 г;  
*допоміжні речовини:* етанол 70 %.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Прозора, безбарвна рідина своєрідного запаху.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ТОВ «Чернігівська фармацевтична фабрика».  
Україна, 14017, м. Чернігів, вул. Щорса, 52.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.  
Код АТС M02A X10.

*Фармакологічні властивості.* Спирт мурашиний відноситься до засобів, що подразнюють нервові закінчення, зокрема діють на чутливі нервові закінчення. Внаслідок стимуляції рецепторів шкіри і підшкірних утворень препарат виявляє не тільки рефлекторний, а й загальний гуморальний вплив. Подразнення Спиртом мурашиним рецепторів супроводжується стимуляцією утворення і вивільнення ендорфінів, динорфінів, пептидів, що відіграють важливу роль в регуляції больових відчуттів, проникності судин та інших процесів.

**Показання для застосування.**

Невралгії, міозити, артралгії.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препарату. Екземи, запальні та інфекційні захворювання шкіри, локалізовані в ділянці його застосування, а також алергічні захворювання.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Не наносити на слизові оболонки та запобігати попаданню препарату в очі, оскільки спирт, що міститься в засобі, може спричинити опіки, сильне подразнення.

**Особливі застереження.**

Відсутні.

**Спосіб застосування та дози.**

Спирт мурашиний застосовують зовнішньо для розтирання ураженої ділянки тіла. Кратність застосування препарату і тривалість курсу визначаються характером і вираженістю захворювання.

**Передозування.**

Не спостерігалось.

**Побічні ефекти.**

Можливі сильне подразнення шкіри, висипи, утворення пухирів.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, що містять органічні сполуки, можуть утворюватися нові сполуки, денатурація білкових компонентів.

**Термін придатності.**

3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі від +8 - +15 °С, захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 50 мл у флаконі.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.