

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КАРБОПЛАСТ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г крему містить сечовини 350 мг у перерахуванні на 100 % суху речовину;

допоміжні речовини: фенілетиловий спирт, парафін білий м'який, парафін рідкий, цетиловий спирт, стеариловий спирт, макроголу цетостеариловий ефір, кремнію діоксид колоїдний безводний, вода очищена.

Лікарська форма. Крем.

Крем білого кольору зі специфічним запахом трояндової олії.

Назва і місцезнаходження виробника. ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.

Фармакотерапевтична група. Засоби для застосування в дерматології. Препарати сечовини. Код АТС D02A E01.

Фармакологічні властивості.

Карбопласт – засіб, що спричиняє оніхоліз. Висока концентрація сечовини в препараті розм'якшує кератин нігтьової пластини, ураженої грибок, що веде до її безкровного та безболісного відшарування. Видалення ураженої грибок нігтьової пластини створює умови для подальшого місцевого антифунгального лікування. Допоміжні речовини, що входять до складу крему, утримують діючу речовину (сечовину) на місці нанесення, перешкоджають її всмоктуванню в системний кровотік.

Показання для застосування. Видалення ураженої нігтьової пластинки при оніхомікозах.

Протипоказання. Гіперчутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження. Не можна допускати потрапляння препарату в очі, на шкіру та на відкриті рани. У разі виникнення подразнень на прилеглих до нігтя ділянках шкіри перед нанесенням крему, шкіру навколо ураженого нігтя слід захистити пластиром або будь-якою іншою водонепроникною пов'язкою.

Застосування в період вагітності або годування груддю. Можливе застосування препарату в період вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат не впливає на швидкість психомоторних реакцій, його можна у рекомендованих дозах застосовувати особам, які керують автотранспортом і працюють зі складними механізмами.

Діти. Строго контрольованих досліджень щодо ефективності та безпеки препарату у дітей не проводилося, тому не рекомендується застосовувати препарат у цій віковій категорії.

Спосіб застосування та дози. Перед нанесенням крему призначається лужно-мильна ванночка. Крем Карбопласт слід нанести суцільним тонким шаром на уражений ніготь, потім закрити водонепроникним пластиром та залишити на 48 годин. Потому зняти пластр, потримати ніготь у теплій воді протягом 10 хв та розм'якшену інфіковану частину нігтя видалити скребком. Якщо нігтьове ложе не стало повністю гладеньким, слід накласти нову порцію крему і закрити пластиром. Лікування кремом проводять доти, доки ложе нігтя не стане гладеньким і не буде видалена вся його розм'якшена частина. Тривалість лікування залежить від величини ураженої ділянки та товщини нігтя. Щоб повністю видалити частково або повністю уражену грибами нігтьову пластину до нігтьового ложа необхідно 1 - 3 експозиції по 48 годин (2 - 6 днів). Після видалення нігтя слід провести терапію протигрибковим препаратом для місцевого застосування за призначенням лікаря протягом 4 тижнів. Ефект лікування грибових захворювань нігтів залежить, в основному, від ретельного видалення ураженої частини нігтя і від подальшої протигрибкової терапії.

У випадках, коли не вдалося отримати бажаний ефект при першому курсі застосування препарату, слід проконсультуватися з лікарем, який, можливо, призначить повторний курс лікування.

Передозування. При місцевому застосуванні препарату передозування малоімовірне.

Побічні ефекти. При потрапленні крему на ділянки шкіри, прилегли до нігтя, можливе відчуття печіння, подразнення, свербіж.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші форми взаємодій. Препарат не можна застосовувати одночасно з іншими лікарськими засобами місцевого застосування. Дані про можливу взаємодію з іншими лікарськими засобами відсутні.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Препарат необхідно зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Не заморозувати.

Упаковка. По 15 г, 30 г у тубі, по 1 тубі в упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.