

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 1 флакон містить настойки листя евкаліпта (1 : 5) 25 мл;

*допоміжна речовина:* етанол 70 %.

**Лікарська форма.** Настойка.

Прозора рідина зеленувато-бурого кольору зі специфічним запахом; допускається утворення осаду при зберіганні.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ВАТ «Фітофарм».

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні засоби. Код АТС А01А D11.

Евкаліпта настойка має у своєму складі дубильні речовини, елагову кислоту, флавоноїди, смоли, віск, ефірну олію, до складу якої входять різні терпенові сполуки, особливо активні до грампозитивних, грамотрикативних мікроорганізмів, які згубно впливають на гриби та найпростіші. Евкаліпт пригнічує ріст золотистого стафілококу, ешерихій, туберкульозних мікобактерій, трихомонад, дизентерійної амеби. Основним компонентом ефірної олії є цинеолмоноциклічний терпен. Евкаліпта настойка має антисептичну, протизапальну і дезінфікуючу дію, яка зумовлена окиснювальним ефектом цинеолмоноциклічного терпена і протизапальним впливом, пов'язаним практично з усіма фізіологічно активними речовинами, які входять до її складу. Препарат виявляє також помірний седативний (заспокійливий) вплив.

**Показання для застосування.**

Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, носоглотки та ротової порожнини (трахеїт, ларингіт, фарингіт, гінгівіт, стоматит), ушкодження шкіри (у тому числі інфіковані рани), а також легкі форми невротичних розладів (дратівливість, емоційна лабільність, порушення засинання та сну).

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 12 років.

**Особливі застереження.*****Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується вживати внутрішньо жінкам у період вагітності чи годування груддю.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.***

Оскільки у складі препарату міститься етанол, не рекомендується застосовувати Евкаліпта настойку під час керування автомобілем та проведення робіт із застосуванням потенційно небезпечних механічних пристроїв.

***Діти.***

Не застосовується внутрішньо у дітей до 12 років через вміст етанолу.

Інструкцію завантажено з сайту [www.dovgolit.com](http://www.dovgolit.com)

**Спосіб застосування та дози.**

Евкалипта настойку приймають внутрішньо, а також застосовують для полоскання та парових інгаляцій.

Дорослим рекомендується приймати внутрішньо по 15 - 30 крапель настойки 3 - 4 рази на день після їжі; дітям старше 12 років – з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 - 4 рази на день після їжі.

Для полоскання розводять 10 - 15 крапель настойки у 200 мл теплої кип'яченої води.

Парові інгаляції проводять за допомогою інгаляторів будь-якого типу, застосовуючи Евкалипта настойку в нерозведеному стані або після попереднього розведення її водою (як для полоскання).

Тривалість застосування препарату залежить від досягнутого лікувального ефекту і визначається лікарем.

**Передозування.**

Не встановлено.

**Побічні ефекти.**

При підвищеній чутливості до препарату можуть виникнути алергічні реакції (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж), іноді – контактний дерматит (в ділянці губ). При виражених реакціях застосування препарату припиняють.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не відома.

**Термін придатності.**

5 років.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.