

ІНСТРУКЦІЯ**для медичного застосування препарату
ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ (ЗА О. В. ВИШНЕВСЬКИМ)****Склад лікарського засобу:**

діючі речовини: 1 г лініменту містять дьогтю березового 0,03 г, ксероформу 0,03 г. *допоміжні речовини:* кремнію діоксид колоїдний, олія рицинова.

Лікарська форма. Лінімент.

Лінімент від світло-жовтого до бурого кольору, зі специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"

або ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Код АТС D08AX 10**.

Препарат має антисептичні властивості. Чинить слабку подразнювальну дію на рецептори тканин, сприяє прискоренню процесу регенерації епідермісу, нормалізуючи кровопостачання тканин.

Показання для застосування. Гнійно-запальні процеси (абсцеси, фурункули), а також інфіковані рани, трофічні виразки, пролежні, обмороження, опіки.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Запобігати потраплянню лініменту в очі. У разі випадкового потрапляння лініменту в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.

Особливі застереження. Слід з обережністю застосовувати препарат особам з підвищеною чутливістю до фенолу і його похідних.

- **Застосування у період вагітності та годування груддю.** В періоди вагітності і годування груддю доцільність застосування вирішує лікар з урахуванням співвідношення користь для матері/ризик для дитини.

- **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами.

- **Діти.** Безпека та ефективність застосування препарату дітям не встановлені.

Спосіб застосування та дози. Застосовують зовнішньо. Дорослим наносять 2 -3 рази на добу тонким шаром на уражені ділянки шкіри або накладають пов'язку у 5 - 6 шарів марлі, просоченої препаратом. Пов'язку фіксують. Тривалість курсу лікування – від 6 до 20 діб.

Передозування. Дані відсутні.

Побічні ефекти. При тривалому застосуванні можливі прояви місцевої алергічної реакції (висипи, свербіж).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Взаємодія поки що не відома.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. В захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 20 г в банках, по 25 г в тубах.

Категорія відпуску. Без рецепта.