

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

ЙОД

**Склад лікарського засобу:**

дюча речовина: йод;

1 мл розчину містить йоду 0,05 г;

допоміжні речовини: калієвий йодид, етанол 96 %, вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Рідина червоно-бурового кольору з характерним запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика».

Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код ATC D08A G03.

Препарат містить елементарний йод, для якого характерними є протимікробна, місцевоподразнювальна та відволікаюча дія. При нанесенні на шкіру і слизові оболонки препарат зумовлює подразнювальну дію і може спричинити рефлекторні зміни в діяльності організму. Проникаючи, йод активно впливає на обмін речовин, посилює процеси дисиміляції.

**Показання для застосування.**

Застосовують зовнішньо як антисептичний, подразнювальний засіб при інфекційно-запальних захворюваннях шкіри та слизових оболонок, для обробки операційного поля, для профілактики інфікування невеликих ушкоджень цілісності шкіри, для зменшення запальних процесів при міозитах, невралгіях (чинить відволікачу дію).

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до йоду. Також препарат протипоказаний при діабетичних, трофічних виразках.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Слід бути обережними при застосуванні йоду на слизові оболонки, оскільки спирт, що міститься в препараті, може спричинити опіку, сильне подразнення. Не допускати потрапляння препарату в очі. Слід бути особливо обережними при застосуванні йоду у пацієнтів зі світлим волоссям.

Не слід застосовувати на великі ділянки шкіри через можливий розвиток опіку.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

**Особливі застереження.**

Відсутні.

**Способ застосування та дози.**

При зовнішньому застосуванні йодом змочують ватний тампон, який використовують для обробки уражених ділянок шкіри.

**Передозування.**

При передозуванні можливі явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слізотеча, слинотеча, вугрові висипи на шкірі), опіки, подразнення шкіри.

Терапія симптоматична.

**Побічні ефекти.**

Можлива поява нежитю, кропив'янки, набряку Квінке, сліно- та слізотеча, висипів на шкірі, контактного дерматиту.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, що містять органічні сполуки, може спостерігатися денатурація білкових компонентів.

**Термін придатності.**

3 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.*

**Умови зберігання.**

Зберігати в прохолодному, захищенному від світла місці при температурі 8 - 15 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 10 мл у флаконах-крапельницях.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.