

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПЕРТУСИН
(PERTUSSINE)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: темно-коричнева рідина з приємним запахом, солодкого смаку;
склад: 100 г препарату містять екстракту чабрецю рідкого 12 г, калію броміду 1 г;
допоміжні речовини: сироп цукровий, спирт етиловий 80% 5 г.

Форма випуску. Рідина.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код АТС: R05C A10.

Фармакологічні властивості. Пертусин стимулює відхаркування, має ефект, який пом'якшує кашель та виявляє седативну дію. Препарат стимулює мукоциліарний кліренс.

Фармакокінетика не вивчалась.

Показання для застосування. Препарат призначають при бронхітах, трахеїтах, пневмоніях, коклюшу.

Спосіб застосування та дози. Препарат призначають внутрішньо дітям (залежно від віку) від 0,5 чайної ложки до 1 десертної ложки, дорослим – по 1 столовій ложці 3 рази на добу.

Побічна дія. При тривалому застосуванні можливі явища бромізму: шкірні висипи, риніт, кон'юнктивіт, гастроентероколіт, загальна слабкість, атаксія, брадикардія і т. ін.

Протипоказання. Індивідуальна несприйнятливості компонентів препарату, у тому числі бромідів, декомпенсована серцева недостатність, артеріальна гіпотензія, виражений атеросклероз, анемія, хвороби нирок, цукровий діабет.

Передозування. Можливі явища бромізму.

Особливості застосування. Відсутні.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, прохолодному, недоступному для дітей місці. Термін зберігання – 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 г у флаконах або флаконах полімерних, по 100 г у флаконах, флаконах полімерних або банках полімерних.

Виробник. Комунальне підприємство “Луганська обласна “Фармація”,
Фармацевтична фабрика.

Адреса. Україна, 91020, м. Луганськ, Степовий тупик, 2.