

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

Евкалипт-М

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: евкалипта олія, ментол;

1 таблетка для розсмоктування містить евкалипта олії 5,5 мг, ментолу 6 мг;

допоміжні речовини: сорбіт (Е-420), магнію стеарат, сахарин, добавка ароматична „Мед” (містить монопропіленгліколь), барвник хіноліновий жовтий (Е-104), барвник індигокармін (Е-132).

Лікарська форма. Таблетки для розсмоктування.

Таблетки плоскі, круглі, зі скошеним краєм, світло-зеленого кольору зі світлішими і темнішими вкрапленнями, із запахом ментолу та евкалипта. З обох боків таблетки - гравіювання «NP» на фоні дерева.

Назва і місцезнаходження виробника.

Натур Продукт Європа Б.В.,

Твеберг 17, 5246 XL, Розмален, Нідерланди.

Фармакотерапевтична група. Код АТС R05C A10.

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Комбінації.

Фармакологічні властивості. Антисептичний засіб рослинного походження для лікування запальних захворювань порожнини рота та горла. Чинить місцеву протизапальну і антисептичну дію. Евкаліпт та ментол зменшують подразнення горла, полегшують кашель при запаленні верхніх дихальних шляхів, освіжають подих. Ментол – місцевоподразнювальний засіб, ефект якого в основному обумовлений рефлекторними реакціями, пов'язаними з подразненням чутливих рецепторів слизових оболонок. Чинить легку анестезуючу (відволікаючу) дію. Евкаліптове масло чинить стимулюючу дію на рецептори слизових оболонок і чинить протизапальну та антисептичну дію.

Показання для застосування. Запальні захворювання порожнини рота, глотки та верхніх дихальних шляхів: фарингіти, ларингіти, трахеїти.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 8 років.

Особливі застереження.

За відсутності лікувального ефекту необхідно звернутися до лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю У період вагітності та годування груддю застосовують у випадках, коли, на думку лікаря, користь від застосування перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Застосовують дітям старше 8 років.

Спосіб застосування та дози.

Таблетки слід розсмоктувати в роті, не розжовуючи. Дорослим: по 1 таблетці 3-4 рази на добу.
Дітям старше 8 років: 1-2 таблетки на добу. Тривалість лікування не повинна перевищувати 5 днів.

Передозування.

Можливі алергічні реакції при передозуванні препарату.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції у вигляді шкірного висипу, в окремих випадках – диспептичні явища.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Клінічно значимої взаємодії препарату з лікарськими засобами інших груп не виявлено.

Термін придатності.

3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 10 таблеток у блістері з ПВХ/Al. По 2 блістери у картонній пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.