

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВАЛОКОРМІД

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 мл препарату містить валеріани настойки (1:5) 0,333 мл, конвалії настойки (1:10) 0,333 мл, красавки (беладони) настойки (1:10) 0,167 мл, натрію броміду 133 мг, ментолу 8,3 мг;

допоміжна речовина: вода очищена.

Лікарська форма. Краплі.

Прозора рідина зеленкувато-, червонувато- або жовтувато-бурого кольору, із запахом валеріани і ментолу.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Фітофарм".

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні засоби. Код АТС N05C M50.

Валокормід чинить заспокійливу та спазмолітичну дію. Специфічна дія препарату обумовлена речовинами, що входять до його складу. Валеріанова кислота обумовлює заспокійливу дію на центральну нервову систему. Настойка красавки блокує М-холінорецептори гладеньких м'язів внутрішніх органів, внаслідок чого чинить спазмолітичну дію. Настойка конвалії підвищує скорочувальну властивість міокарда, збільшує ударний і хвилинний об'єм крові. Натрію бромід посилює процеси гальмування у корі головного мозку, відновлює рівновагу між процесами збудження і гальмування при підвищеній збудливості. Ментол подразнює слизову оболонку ротової порожнини, рефлекторно розширює коронарні судини.

Показання для застосування. Серцево-судинні неврози, що супроводжуються брадикардією.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Глаукома, органічні ураження серця, гіпертрофія передміхурової залози, захворювання нирок. Вагітність і період годування груддю. Дітям будь-якого віку.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Прийом препарату під час вагітності протипоказаний. За необхідності лікування Валокормідом годування груддю необхідно припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат може впливати на швидкість реакції, тому при його застосуванні слід утримуватися від керування автотранспортом і роботи з іншими механізмами.

Діти. Препарат не застосовують дітям через відсутність досвіду застосування.

Спосіб застосування та дози. Застосовують внутрішньо дорослим.

Призначають по 10–20 крапель 2–3 рази на день до їди. Тривалість лікування залежить від характеру захворювання, досягнутого терапевтичного ефекту та переносимості препарату.

Передозування.

При передозуванні препарату можливий розвиток виражених побічних реакцій.

Негайне припинення застосування препарату і вчасно призначені заходи екстреної допомоги (промивання шлунка, введення активованого вугілля тощо) та симптоматичне лікування сприяє швидкому усуненню клінічних проявів передозування.

Побічні ефекти.

Сухість у роті, спрага, головний біль, запаморочення, сонливість, загальна слабкість, біль у животі, нудота, порушення зору, відчуття серцебиття, пригнічення емоційних реакцій, зниження працездатності. Підвищені чутливості до бромиду та інших компонентів препарату можливі розвиток алергічних реакцій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат має здатність потенціювати дію седативних, снодійних, анальгетичних та спазмолітичних засобів.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.