

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ХЛОРГЕКСИДИНУ БІГЛЮКОНАТ
(CHLORHEXIDINE BIGLUCONAT)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: chlorhexidine; NN"-біс-(4-Хлорфеніл)-3,12-діміно-2,4,11,13-тетраазатетрадекандіімідамід;

основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна рідина, без запаху;

склад: 1 мл розчину містить хлоргексидину біглюконату 0,5 мг;

допоміжні речовини: вода очищена.

Форма випуску. Розчин для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні засоби. Код АТС D08A C02.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат має хлоруючу і окислювальну дію на мікробну клітину (викликає денатурацію білків та окислення ряду ферментів). Проявляє швидку і виражену бактерицидну дію відносно грам позитивних і грам негативних бактерій, а також збудників венеричних захворювань (трепонем, гонококів, трихомонад). Не діє на віруси, спори, гриби.

Фармакокінетика. При зовнішньому застосуванні препарат не надходить до кров'яного русла.

Показання для застосування. Застосовують при лікуванні гнійно-септичних процесів, для дезінфекції мікротравм (ран, подряпин, опіків), а також для профілактики венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, трихомоніаз).

Спосіб застосування та дози. Препарат застосовують зовнішньо. При мікротравмах шкіру навколо рани обробляють розчином, після чого на рану накладають серветку, змочену розчином, і фіксують її пов'язкою або пластирем.

Перед застосуванням препарату з метою профілактики венеричних захворювань слід помочитися, вимити руки та статеві органи. Після цього слід зняти кришку, натиснути на стінки флакона і струменем розчину обробити шкіру лобка, внутрішніх поверхонь стегон, статевих органів. У зовнішній отвір сечівника слід ввести носик насадки, щільно притиснути до нього стінки сечівника і витиснути 1,5 – 3 мл розчину (для чоловіків) або 1 – 1,5 мл розчину (для жінок). Потім, не розтуляючи пальців, витягають насадку із сечівника, а розчин затримують протягом 2 – 3 хвилин. Розчином, що залишився, жінки обприскують вагіну. Після процедури рекомендується не мочитися протягом 2 годин. Цей профілактичний захід ефективний, якщо він проведений не пізніше 2 годин після статевого акту.

Побічна дія. При підвищеній індивідуальній чутливості можливі сухість та свербіж шкіри, дерматити.

Протипоказання. Схильність до алергічних реакцій і алергічних захворювань, дерматити, вірусні захворювання шкіри. Не рекомендується застосовувати для обробки кон'юнктиви і промивання порожнин.

Передозування. При передозуванні можливо посилення побічних реакцій.

Особливості застосування. Відсутні.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Препарат підвищує чутливість бактерій до левоміцетину, канаміцину сульфату, неоміцину сульфату, цефалоспоринов.

Хлоргексидину біглюконат несумісний з препаратами йоду із-за небезпеки виникнення дерматитів.

Умови зберігання. Зберігати в захищеному від світла, недоступному для дітей місці при кімнатній температурі. Термін зберігання – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 100 мл у флаконах полімерних з насадкою.

Виробник. Комунальне підприємство “Луганська обласна “Фармація”,
Фармацевтична фабрика.

Адреса. Україна, 91020, м. Луганськ, Степовий тупик, 2.