

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЗИНАКСИН®
(ZINAXIN®)

Склад лікарського засобу:

1 капсула містить: діючі речовини:

екстракту імбиру (*Zingiber officinale*) (1:20) -150 мг;

екстракту альпінії (*Alpinia galanga*) (1:42) -15 мг;

допоміжні речовини: моногліцериди ефіру оцтової кислоти, тригліцериди середнього ланцюга, віск жовтий, кремнію діоксид колоїдний безводний, желатин, гліцерин, титану діоксид (E 171), мідні комплекси хлорофілів (E 141).

Лікарська форма. Капсули м'які.

Овальна капсула з непрозорою оболонкою зеленого кольору і клейким вмістом, що є біокомплексом на основі імбиру (77/15), отриманим завдяки застосуванню LipoCap™-технології.

Назва і місце знаходження виробника.

Ферросан А/С, Сидмаркен 5, ДК-2860, Себорг, Данія.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при патології опорно-рухового апарату. Код АТХ М09А Х10**.

Механізм дії активних речовин, що входять до складу препарату, реалізується за рахунок інгібування циклооксигенази, 5-ліпоксигенази та зниження негативного впливу підвищеного рівня фактора некрозу пухлин (TNF- α), що забезпечує протизапальну дію та знеболювальний ефект протягом тривалого часу.

Показання для застосування.

Лікування болю та скрутості суглобів, спричинених остеоартритом, остеохондрозом (у комплексному лікуванні).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 12 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Особи, які мають тяжкі захворювання або особи, які знаходяться під медичним наглядом, до прийому будь-яких засобів на основі лікарських трав повинні проінформувати про це свого лікаря перед початком застосування препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Слід уникати застосування препарату під час вагітності та в період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Немає даних.

Діти.

Препарат не застосовують дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям старше 12 років – по 1 капсулі 2 рази на добу під час їди. Капсулу слід запити великою кількістю води. Рекомендований курс лікування 6 - 12 тижнів.

Передозування.

Не описано жодного випадку передозування. Бажано не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Побічні ефекти.

Препарат звичайно переноситься добре, але може виникнути шлунково-кишковий дискомфорт, диспепсія, нудота, відрижка. Якщо зазначені явища спостерігаються більше двох тижнів, слід звернутися до лікаря. У осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.

Взаємодія поки що не відома. Якщо Ви застосовуєте будь-які інші лікарські засоби, слід проконсультуватись з лікарем щодо можливості приймання препарату.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 капсул у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній упаковці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.