

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**МЕБСІН РЕТАРД**  
**(MEBSYN RETARD)**

**Склад:**

*діюча речовина:* mebeverine;

1 капсула містить мебеверину гідрохлориду у вигляді пелет пролонгованої дії 200 мг;

*допоміжні речовини:* целюлоза мікрокристалічна, маніт (Е 421), цукроза, натрію лаурилсульфат, етилцелюлоза.

**Лікарська форма.**

Капсули.

**Фармакотерапевтична група.**

Синтетичні антихолінергічні засоби, етерифіковані третинні аміни.

Код АТС А03А А04.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Симптоматична терапія синдрому подразненої товстої кишки (персистуюча діарея, чергування діареї та запору, біль та постпрандіальний дискомфорт); шлунково-кишкових спазмів, зумовлених органічними захворюваннями. Функціональні розлади жовчовивідних шляхів та жовчного міхура по гіпертонічному гіперкінетичному типу.

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до мебеверину гідрохлориду. Дитячий вік.

**Спосіб застосування та дози.**

Дорослі застосовують по 1 капсулі 3 рази на добу, за 20 хв перед їжею, не розжовуючи, запиваючи великою кількістю води.

Тривалість лікування визначається перебігом захворювання.

**Побічні реакції.**

Можливі алергічні реакції (висипи на шкірі, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, в тому числі набряк обличчя), депресія, головний біль, запаморочення, діарея або запор.

**Передозування.**

*Симптоми:* збудження центральної нервової системи.

*Лікування:* специфічний антидот невідомий. Видалення неабсорбованого препарату із шлунково-кишкового тракту (промивання шлунка, активоване вугілля), симптоматична та підтримуюча терапія.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У період вагітності застосування можливе лише у разі, коли очікуваний ефект терапії перевищує потенційний ризик для плода.

Жінкам, які годують груддю, слід суворо дотримуватись терапевтичної дози (при звичайній схемі

Інструкцію завантажено з сайту [www.dovgolit.com](http://www.dovgolit.com)

**Діти.**

Препарат не рекомендується призначати дітям.

**Особливості застосування.**

Довготривале застосування препарату пацієнтами зі спадковими захворюваннями крові (порфіріаз) може спричинити різні несприятливі симптоми, в тому числі порушення з боку центральної нервової системи.

Мебсін Ретард можна призначати пацієнтам з глаукомою або гіпертрофією передміхурової залози, оскільки він не має атропіноподібного ефекту.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Під час лікування послаблюється швидкість психомоторних реакцій, тому слід уникати керування автотранспортом та роботи з іншими механізмами.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не встановлена.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Міотропний спазмолітик з селективною дією на гладкі м'язи травного тракту. Усуває спазм сфінктера, не впливаючи на нормальну перистальтику. Інгібує фосфодіестеразу, стабілізує рівень циклічної аденозинмонофосфорної кислоти. Мебеверин також є інгібітором поповнення запасів кальцію. Таким чином, мебеверин має подвійний спосіб дії, який нормалізує знижену кишкову моторику.

**Фармакокінетика.** Мебеверин швидко і повністю абсорбується після прийому. В організмі повністю засвоюється, зазнає пресистемного гідролізу і не виявляється в плазмі. Мебеверин гідролізується з утворенням вератрової кислоти та мебеверинового спирту. Вератрова кислота екскретується з сечею. Мебевериновий спирт також виділяється нирками у вигляді відповідних карбоксильної та диметилкарбоксильної кислот. У невеликих кількостях визначається в жовчі. Повністю виводиться протягом 24 годин.

**Фармацевтичні характеристики:**

**основні фізико-хімічні властивості:** тверді желатинові капсули № 1, корпус оранжевого кольору, кришечка білого кольору, мають написи «S» на обох частинах та містять в собі пелети білого кольору.

**Термін придатності.**

2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 10 капсул у блістері, по 3 блістери у пачці з картону.

**Категорія відпуску.**

За рецептом.

**Виробник.**

Сінмедик Лабораторіз, Індія.

**Місцезнаходження.**

166, ДЛФ Індастріал Ереа, Фейз – 1, Фарідабад – 121 003, Індія.