

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АКТОВЕГІН
(ACTOVEGIN®)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 100 г гелю містять депротейнізований гемодериват із крові телят 20 мл, що відповідає 800 мг сухої маси;

допоміжні речовини: натрію кармелоза, пропіленгліколь, кальцію лактат пентагідрат, метилпарагідроксibenзоа (Е 218), пропілпарагідроксibenзоат (Е 216), вода очищена.

Лікарська форма. Гель.

Безбарвний або жовтуватий прозорий однорідний гель.

Назва і місцезнаходження виробника.

„Нікомед Австрія ГмбХ“, Австрія.
вул. Петер Штрассе 25, А-4021, Лінц, Австрія.

Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування ран та виразкових ушкоджень.
Код АТС D03A X50.

Актовегін містить речовини з молекулярною масою менше 5000 дальтон. Препарат сприяє прискоренню процесів утилізації кисню (підвищує стійкість до гіпоксії) і глюкози, тим самим сприяє підвищенню енергетичного метаболізму. Сумарний ефект цих процесів полягає в посиленні енергетичного стану клітини, особливо в умовах гіпоксії та ішемії.

Фармакокінетика не вивчена, оскільки препарат містить компоненти, які зазвичай наявні в організмі.

Показання для застосування.

- Рани та запалення шкіри і слизових оболонок, такі як опіки, у тому числі сонячні, порізи шкіри, садна/подряпини.
- Для регенерації тканини після опіків, у тому числі після опіку окропом або паром.
- Виразки варикозного походження або інші мокнучі виразки.
- Профілактика та лікування пролежнів.
- Профілактика та лікування реакцій шкіри та слизових оболонок, зумовлених впливом радіації.

Протипоказання. Гіперчутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування зруддю. Застосування препарату Актовегін 20% гель допускається.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Немає даних щодо застосування препарату дітям.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують місцево.

Гель призначають для очищення та лікування відкритих ран та виразок; при опіках та променевих ураженнях наносять на шкіру тонким шаром 3 – 4 рази на добу; при лікуванні виразок наносять товстим шаром і прикривають компресом з препаратом Актовегін 5% мазь (для попередження присихання до рани). Заміну пов'язки проводять 1 раз на добу, при сильно мокнучих виразках – декілька разів на добу; для лікування променевих уражень – у вигляді аплікацій, для профілактики і терапії пролежнів - 2 - 3 рази на добу.

Курс лікування: 3 – 60 днів залежно від ефективності лікування.

Передозування. На сьогодні про випадки передозування не відомо.

Побічні ефекти. Зазвичай Актовегін 20 % гель переноситься добре.

У поодиноких випадках у пацієнтів можуть виникнути місцеві реакції гіперчутливості (свербіж, печіння).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

Упаковка. Туби по 20 г; по 1 тубі в картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.