

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПРИЧЕПИ ТРАВА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: Videns tripartita L.;
1 пачка містить причепи трави 50 г.

Лікарська форма. Трава.

Шматочки листя, стебел, бутонів і квіток, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір зелений, бурувато-зелений або зеленувато-фіолетовий з бруднувато-жовтими вкрапленнями. Запах слабкий. Смак гіркуватий, злегка в'язкий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика» або ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група.

Дерматологічні препарати. Код АТС D11A X20.

Причепи трава містить флавоноїди (лютеолін-D-глюкопіранозид, бутеїн, сульфуретин, D-глюкопіранозид бутеїну), речовини дубильні конденсовані, каротин, кумарини (умбеліферон і скополетин), кислоту аскорбінову, олію ефірну (сліди), слиз, аміни, гіркоти, -лактони, мікроелементи. Цей комплекс біологічно активних речовин чинить сечогінну, потогінну, протизапальну, антиалергічну, кровоочисну, жовчогінну і бактерицидну дію. Водні витяжки з трави причепи покращують апетит та травлення, нормалізують порушений обмін речовин, знижують артеріальний тиск.

Показання для застосування.

Застосовують внутрішньо при порушенні обміну речовин, як сечогінний засіб при захворюваннях сечовивідних шляхів, як потогінний засіб при застудних захворюваннях (ГРЗ, грип); протиалергічний засіб;
зовнішньо – при шкірних захворюваннях алергічного характеру, діатезах, піодермії, псоріазі, екземах, нейродермітах.

Протипоказання.

Індивідуальна чутливість до біологічно активних речовин, які містяться в лікарському засобі.
Дитячий вік до 12 років (при застосуванні внутрішньо).

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Немає особливих заходів безпеки при застосуванні Причепи трави.

Особливі застереження.***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Безпека та клінічна ефективність препарату у період вагітності і годування груддю не вивчалися, тому призначати внутрішньо Причепи траву можна тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Не впливає.

Діти.

Безпека та ефективність застосування Причепа трави у дітей не встановлені, тому не рекомендується застосовувати внутрішньо препарат дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

8 г (2 столові ложки) трави вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі приймають настій внутрішньо у теплом вигляді по 1/3 склянки 2 - 3 рази на день за 15 - 20 хв до їди.

Перед застосуванням настій рекомендується збовтувати.

Тривалість лікування визначається індивідуально з урахуванням перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Зовнішньо настій застосовують у вигляді примочок.

Передозування.

При підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж).

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції при підвищеній чутливості (кропив'янка, свербіж).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 50 г в пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску.

Без рецепта.