

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ХОЛЕДІУС
(Choledius)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 г препарату містять Chelidonium majus D3 300 мг, Carduus marianus D3 300 мг, Berberis vulgaris D3 1000 мг, Podophyllum peltatum D6 0,3 мг;

допоміжна речовина: етанол 20 % (по об'єму).

Лікарська форма. Краплі гомеопатичні.

Прозора рідина від світло-жовтого до коричнево-жовтого кольору, зі слабким запахом спирту.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ "ТАЛІОН-А", Російська Федерація,
м. Москва, 107370, Відкрите шосе, 12, будів.35.

Назва і місцезнаходження заявника.

ТОВ "ТАЛІОН-А", Російська Федерація,
м. Москва, 107370, Відкрите шосе, 12, будів.35.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний засіб.

Сприяє усуненню хронічного та гострого запалень жовчного міхура, підшлункової залози. Регулює, нормалізує процес травлення. Завдяки дії препарату нормалізується жовчна секреція та секреція підшлункової залози.

Препарат швидко та майже повністю всмоктується після перорального застосування, в основному в порожнині рота і далі в шлунково-кишковому тракті.

Дія препарату є сукупною дією його компонентів. Не депонується у тканинах організму.

Фармакокінетика не вивчалась.

Показання для застосування. В комплексній терапії хронічного холециститу, жовчнокам'яної хвороби, дискінезії жовчних протоків; хронічного панкреатиту.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, цироз печінки, дитячий вік.

Особливі застереження. У період вагітності і лактації перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем. Застосування у дітей не досліджувалось.

Препарат в рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати транспортними засобами та обслуговувати механізми.

Спосіб застосування та дози. Дорослим по 8-10 крапель 1 раз на добу на 1/4 склянки води приймати за півгодини до їди або через 1 годину після їди.

Тривалість курсу лікування до 2 місяців.

Передозування. Малоймовірне. Симптоми передозування не описані.

Побічні ефекти. Алергічні реакції, тимчасове загострення основного захворювання.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій необхідно порадитися з лікарем.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не відома.

Термін придатності. 3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Після розкриття флакона застосувати протягом місяця.

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. Флакони-крапельниці з темного скла по 25 мл у картонній пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.