

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
МАММОЛЕПТИН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 капсула містить порошку Рогів благородного оленя (*Cervus elephus* Linnaeus) - 0,0891г, порошку кореня норичника нінгпоського (*Scrophularia ningpoensis* Hemsl) - 0,0594г, порошку коренів женьшеню несправжнього (*Panax notoginseng* (Burk) F.H.Chen) - 0,0594г, порошку висушеного водного екстракту суміші рослинної сировини (10:1) – 0,1121г ;

Для отримання 0,1121г порошку сухого екстракту використовується 0,7927г суміші рослинної сировини, взятого у відповідності з наступною специфікацією:

коріння трихозанту Кирилова (змійного огірка Кирилова, трихозанту Ростхорна) (*Trichosanthes kirilowii* Maxim., *Trichosanthes rosthornii* Herms) - 0,0238г, коріння півонії молочно квіткової, (півонії білоквіткової, півонії Уїча) (*Paeonia lactiflora* Pall., *Paeonia vetchii* Lynch) - 0,0178г, коріння аукландії лопухолистної (сосюреї лопуховидної) (*Aucklandia lappa* Decne) - 0,0475г, плоди форсайтії повислої (форзиції пониклої) (*Forsythia suspense* (Thunb.) Vahl) - 0,0238г, надземна частина кульбаби монгольської(кульбаби китайської) (*Taraxacum mongolicum* Hand.-Mass., *Taraxacum sinicum* Kitag) - 0,0594г, стебла спатолобусу майже прямостоячого (*Spatholobus suberectus* Dunn.) - 0,0594г, висушена саргасова водорість бліда (саргасова водорість веретеноподібна) (*Sargassum pallidum* (Turn) C.Ag., *Sargassum fusiforme* (Harv.) Setch.) - 0,1158г, бутони сафлору красильного (*Carthamus tinctorius* L.) - 0,0356г, слані ламінарії японської (*Laminaria japonica* Aresch) - 0,2315г, коріння мордовника широколисного (мордовника даурського, мордовника Грижиса) (*Echinops latifolius* Tausch, *Echinops Grijisii* Hance) - 0,0356г, кора півонії напівкущистої (*Paeonia suffruticosa* Andr.) - 0,0831г, колосся чорноголовки звичайної (*Prunella vulgaris* L) - 0,0594г;

допоміжні речовини (оболонка капсул): желатин, титану діоксин (*E 171*) метил пара-гідроксибензоат, пропіл пара-гідроксибензоат, спирт лауриловий, брильянтовий синій.

Лікарська форма. Капсули.

Тверді желатинові капсули з корпусом білого кольору та кришечкою блакитного кольору, які містять порошок від сірувато-бурого до буро-коричневого кольору зі слабким запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

Фармацевтична компанія Хербапекс (груп) Ко. Лтд., провінції Ляонін, Китай.

Китай. Провінція Ляонін, м.Хуаньжень, вул. Сіньяньцзе.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що впливають на статеву сферу. Код АТС G03X A50**.

Комбінований препарат рослинного походження, фармакологічна дія якого обумовлена сукупністю властивостей компонентів, що входять до його складу.

Чинить протизапальну, протинабрякову, анальгезуючу дію. Курсове застосування препарату сприяє послабленню інтенсивності болювого синдрому, що супроводжується регресом структурних змін тканин молочної залози, обумовлених фіброзно-кистозною мастопатією.

Маммолептин впливає на функціональний цикл «гіпоталамус-гіпофіз-яєчники» та всі процеси, які регулюються цим циклом, а також нормалізує функцію печінки, що є необхідною умовою відновлення нормального гормонального фону. Препарат виявляє моделювальний і стимулювальний впливи, що призводить до відновлення нормального гормонального фону у жінок.

Показання для застосування.

У комплексному лікуванні фіброзно-кистозної мастопатії.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Підтверджений рак різноманітної локалізації. Період вагітності

і годування груддю. Дитячий вік до 18 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не застосовується для лікування злоякісних захворювань молочної залози.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний у період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат протипоказаний дітям віком до 18 років.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовують під контролем лікаря.

Застосовувати внутрішньо. Початкова доза для дорослих становить 2 капсули 3 рази на день через 1 годину після їжі з подальшим збільшенням дози на 1 капсулу кожні 5 днів до терапевтичної дози 5 капсул 3 рази на день. Після досягнення терапевтичної дози слід приймати по 5 капсул 3 рази на добу через 1 годину після їди протягом 1 місяця. Рішення щодо необхідності та термінів продовження курсу визначає лікар.

Дні	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 46
Порядок приймання	2 капсули 3 рази на день	3 капсули 3 рази на день	4 капсули 3 рази на день	5 капсул 3 рази на день

Передозування.

При застосуванні дуже великої кількості капсул (більше 50) можуть виникати нудота і блювання.

Лікування: промивання шлунка. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції, у поодиноких випадках – короткочасне відчуття тяжкості в епігастрії, печія, відрижка, сухість у роті.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не рекомендується застосовувати разом із гормональними засобами (пероральними контрацептивами), а також у комплексній терапії з гомеопатичними засобами і препаратами традиційної медицини рослинного та тваринного походження.

Добре поєднується з вітамінними препаратами, антиоксидантними засобами.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 60 капсул у флаконі, у картонній пачці.

Категорія відпуску.
Без рецепта.