

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПРОПОЛІСУ НАСТОЙКА
(TINCTURA PROPOLISI)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: propolis;

1 флакон містить настойки прополісу у співвідношенні 1:10;

допоміжна речовина: етанол.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина від жовто-коричневого до червоно-коричневого кольору із специфічним запахом, при зберіганні можливе випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Монфарм».

Україна, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8.

Фармакотерапевтична група.

Біогенний препарат. Код АТС D03A X12.

Прополіс – продукт життєдіяльності бджіл, містить ряд біологічно-активних речовин: флавоноїди, ефірну олію, похідні коричної кислоти, смоли, віск тощо. Чинить протимікробну, протизапальну дію, нормалізує обмін речовин та прискорює процеси регенерації (відновлення уражених тканин).

Показання для застосування.

Місцево при ранах, порізах, опіках шкіри та при запальних процесах слизових оболонок порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт, парадонтит), глотки (фарингіт), мигдаликів (тонзиліт), вуха (отит) та придаткових пазух носа (гайморит).

Протипоказання.

Прополісу настойка протипоказана при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів препарату, при відомій алергії на продукти бджільництва, а також при гострій екземі та кровотечах з уражених ділянок шкіри або слизових оболонок.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Прополісу настойка призначена виключно для місцевого застосування.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Прополісу настойку не рекомендується застосовувати у період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не рекомендується застосовувати прополісу настойку дітям віком до 3 років.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Спосіб застосування та дози.

При травмах уражені ділянки шкіри змазують настойкою 2 - 3 рази на день.

При отиті в зовнішній слуховий хід після його очищення вводять просочений настойкою тампон або закапують 1 - 2 краплі препарату 3 - 4 рази на день.

При фарингіті або тонзиліті настойкою прополісу змазують слизові оболонки глотки та мигдаликів 2 - 3 рази на день або проводять зрошення водним розчином препарату (розводять настойку теплою водою у співвідношенні 1 : 20).

Придаткові пазухи носа промивають сумішшю настойки прополісу з фізіологічним розчином (0,9 % розчином натрію хлориду) у співвідношенні 1 : 10. Тривалість курсу лікування зазвичай становить 14 днів.

При захворюваннях пародонта в пародонтальні порожнини вводять просочені настойкою прополісу тампони (турунди).

Для полоскання ротової порожнини при ураженнях та ушкодженнях слизової оболонки 30 - 40 крапель прополісу настойки розчиняють в 100 мл теплої води.

Передозування.

Не виявлено.

Побічні ефекти.

Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння шкіри, висипи, свербіж тощо).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами поки що невідома.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі 8 - 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл або 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.