

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ОЦИЛОКОКЦІНУМ®

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г гранул містить екстракту печінки та серця качки барбарийської (*Anas barbariae hepatis et cordis extractum*) 200К 0,01 мл;

допоміжні речовини: сахароза, лактоза.

Лікарська форма. Гранули дозовані.

Гранули білого кольору, практично круглі, легко розчиняються у воді.

Назва і місцезнаходження виробника.

БУАРОН.

Вул. Ліберасьон, 20

Сент-Фуа-ле-Ліон 69110

Франція.

Фармакотерапевтична група.

Гомеопатичні засоби.

Фармакологічні властивості препарату зумовлені дією його компонентів. Засіб чинить стимулюючий ефект на захисні реакції організму.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування та профілактика грипу та гострих респіраторно-вірусних інфекцій, що проявляються пропасницею, ознобом, ломотою в тілі та головним болем.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Рідкісна спадкова непереносимість фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або сахарозо-ізомальтазна недостатність.

Рідкісна непереносимість галактози, дефіцит Lapp-лактази або глюкозо-галактозна мальабсорбція.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки безпека застосування препарату Оцилококцінум у період вагітності та годування груддю не досліджувалась, препарат у цей період застосовують тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не виявлено.

Діти.

Оцилококцінум®, гранули дозовані, рекомендовано для дітей старше 2 років.

Дітям віком від 2 до 6 років перед прийомом гранули слід розчинити у воді.

Спосіб застосування та дози.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Для перорального застосування.

Дорослі та діти

Дозування залежить від стадії захворювання.

Для профілактики захворювання: у період епідемії грипу та загрози застуди приймати по 1 дозі (1 г гранул, вміст 1 пеналу) на тиждень до припинення загрози захворювання.

Початкова стадія захворювання: 1 доза відразу після появи перших симптомів захворювання. Повторити 2 або 3 рази з інтервалом 6 годин.

Виражена стадія захворювання: 1 доза 2 рази на добу (переважно вранці та ввечері) протягом 1 - 3 днів.

Вміст 1 пеналу (1 г гранул) перемістити під язик та тримати у роті до повного розчинення.

Передозування.

Про випадки передозування не повідомлялося.

Побічні ефекти.

Можливі прояви алергічних реакцій в осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не вивчалась.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів та вологи місці при температурі від 4 °С до 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Гранули дозовані по 1 г у поліпропіленові пенали з поліетиленовою кришечкою. У картонній коробці 6 пеналів.

Категорія відпуску.

Без рецепта.