

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ХВОЩА ПОЛЬОВОГО ТРАВА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: herba equiseti arvensis;

1 пачка містить хвоща польового траву 50 г, 100 г.

Лікарська форма. Трава.

Шматочки стебел і гілок частково з вузлами і піхвами, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір сірувато-зелений, запах слабкий. Смак злегка кислуватий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Лубнифарм».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.

Фармакотерапевтична група.

Рослинні препарати з діуретичним ефектом. Код АТС С03В Х10.

Препарати із хвоща польового трави належать до діуретичних засобів. Чинять сечогінну, кровоспинну та протизапальну дію.

Фармакокінетика препарату не вивчалась.

Показання для застосування.

Як сечогінний засіб при захворюваннях серця та інших станах, що супроводжуються застійними явищами, зокрема набряками при хронічній серцевій недостатності. Призначають також при циститах, уретритах, гемороїдальних і маткових кровотечах.

Протипоказання.

Нефрити, нефрози, нефрозо-нефрити. Підвищена чутливість до хвоща польового трави.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає протипоказань для застосування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Безпека та ефективність застосування Хвоща польового трави для дітей не встановлені, тому не рекомендується без призначення лікаря застосовувати препарат дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують у вигляді відвару. 10 г (2 столові ложки) трави заливають склянкою холодної води і кип'яють протягом 30 хв на слабкому вогні, охолоджують і проціджують. Дорослі приймають по 1 столовій ложці 3 - 4 рази на добу. Діти старше 12 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу. Перед застосуванням відвар рекомендується збовтувати.

Тривалість застосування визначається індивідуально.

Передозування.

Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж).

Побічні ефекти.

Препарати із хвоща польового трави можуть спричинити подразнення нирок. Алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла та вологі місці при температурі від 15 °С до 25 °С.

Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 50 г, 100 г у пацці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.