

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 5 мл сиропу містять плюща звичайного листя екстракту сухого 35 мг;
допоміжні речовини: натрію цитрат; кислота лимонна, моногідрат; сорбіт (Е 420) – 1925 мг; калію сорбат – 6,7 мг; ксантанова камедь; ароматизатор харчовий «Вишня 667» (розчинник пропіленгліколь – 0,625 мг); вода очищена;
2,5 мл сиропу містять 963 мг цукрозамінної речовини сорбіту = 0,080 хлібних одиниць.

Лікарська форма. Сироп.

Прозора рідина світло-коричневого кольору із запахом вишні та солодким фруктовим смаком, можлива поява легкої опалесценції.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Фармак».

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.

Фармакотерапевтична група.

Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A16**.

Препарат рослинного походження. До його складу входить сухий екстракт листя плюща, який чинить муколітичну, мукокінетичну, помірну спазмолітичну дію зумовлену присутніми у ньому глікозидами (сапонінами). Секретолітичний ефект екстракту пояснюється дією сапонінових глікозидів, що входять до складу листя плюща. Спазмолітичні властивості його проявляються завдяки парасимпатолітичним ефектам певних глікозидів, що входять до складу препарату. Активація β_2 -рецепторів у клітинах м'язів бронхів та епітелію легень стимулює адренергічні ефекти. Це призводить до зниження складу внутрішньоклітинного Ca^{2+} в м'язах бронхів та розслаблення бронхів. Одночасно з цим процесом внаслідок стимуляції β_2 -активності епітеліальні альвеолярні клітини легень II типу продукують більшу кількість сурфактанту. Препарат не призводить до погіршення центральної регуляції дихання.

Показання для застосування.

Гострі запальні захворювання дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем; симптоматичне лікування хронічних запальних захворювань бронхів.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження.

Препарат містить сорбіт, тому не рекомендується для застосування хворим з непереносимістю фруктози.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування в період вагітності та годування груддю не рекомендується (у зв'язку з недостатністю клінічних даних).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат застосовують дітям віком від 1 року.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують внутрішньо, використовуючи мірну ложечку.

Перед кожним застосуванням сиропу флакон необхідно ретельно збовтати.

Дітям віком від 1 до 6 років – по 2,5 мл 3 рази на добу;

дітям старше 6 років – по 5 мл 3 рази на добу;

дорослим – по 5 - 7,5 мл 3 рази на добу.

Тривалість лікування препаратом визначається характером і тяжкістю захворювання, проте тривалість терапії повинна становити не менше 1 тижня.

Для отримання стійкого терапевтичного ефекту рекомендується продовжити лікування препаратом ще 2 - 3 доби після усунення симптомів захворювання. Якщо покращення не настає необхідна консультація лікаря. Загальну тривалість курсу лікування визначає лікар.

Передозування.

До теперішнього часу про випадки передозування препарату не повідомлялося.

При застосуванні препарату у дозі, що в 3 рази перевищує добову дозу, можуть з'явитися нудота, блювання і діарея, що потребує негайного звернення до лікаря. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Препарат зазвичай добре переноситься, але іноді можуть розвинути діарея, нудота, блювання, алергічні шкірні реакції.

У разі виникнення будь-яких побічних реакцій слід відмінити лікування та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

2 роки.

Після першого розкриття флакона препарат можна застосовувати протягом 90 діб.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 мл у флакони скляні з гвинтовим горлом із коричневого скла, закупорені кришками гвинтовими з кільцем контролю розкриття.

Кожний флакон разом з дозуючою ложкою вміщують у пачку з картону.

Категорія відпуску.

Без рецепта.