

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

ХЕЛІСКАН®

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 мл настойки (1:10) із суміші лікарської рослинної сировини: нагідок квіток 1,5 г, омели білої пагонів та листя 1,5 г, софори японської плодів 1 г, розторопші плямистої плодів 1,5 г, півонії відхиленої кореневищ і коренів 1,5 г, вівса посівного трави 1,5 г, чистотілу трави 1,5 г;
допоміжна речовина: етанол (40 %).

Лікарська форма. Настойка.

Рідина жовтувато-коричневого кольору, з ароматним специфічним запахом.
Допускається випадання осаду в процесі зберігання.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».
61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.

Фармакотерапевтична група.

Цитокіни та імуномодулятори. Код АТС L03A X.

Препарат рослинного походження, виявляє багатосторонній терапевтичний ефект, зумовлений комплексом біологічно активних речовин, які входять до його складу. Квітки нагідок чинять ранозагоювальну, бактерицидну, протизапальну, помірну жовчогінну дію, знижують рефлекторну збудливість. Пагони омели білої чинять сечогінну, кровоспинну, знеболювальну, протизапальну, антиатеросклеротичну, гіпотензивну дію; стимулюють серцеву діяльність, зменшують збудливість центральної нервової системи. Плоди софори японської мають ранозагоювальні властивості, прискорюють регенерацію тканин, зменшують ламкість та проникність капілярів, підвищують здатність організму засвоювати аскорбінову кислоту. Плоди розторопші плямистої чинять гепатозахистну, холеретичну і жовчогінну дію, сприяють поліпшенню функції печінки, нормалізують травлення. Корені та кореневища півонії відхиленої чинять заспокійливу дію при підвищеній збудливості, фобіях, іпохондричних станах, при вегетативно-судинних порушеннях різної етіології, а також знеболювальну дію; підвищують кислотність шлункового соку. Трава вівса посівного виявляє потогінний, сечогінний, жарознижувальний ефекти. Чистотілу трава чинить протизапальну, протимікробну, протигрибкову, протитрихомонадну, протитуберкульозну, імунодепресивну, цитостатичну і антигістамінну дію.

Хеліскан® чинить імуномодельючу, антитоксичну, стресопротекторну (нормалізує соматичні, імунологічні, біохімічні та морфологічні показники стрес-реакції організму), тонізуючу та антиоксидантну дію. Препарат послаблює побічні явища та сприяє зберіганню нормального кістково-мозкового кровотворення при проведенні цитостатичної та променевої терапії, сприяє підвищенню неспецифічної опірності організму.

Показання для застосування.

У складі комплексної терапії у дорослих:

- часті рецидивуючі та хронічні вірусні, грибкові і бактеріальні інфекційно-запальні захворювання дихальних шляхів, бронхіт (у тому числі у пацієнтів з мастопатією та аденомою передміхурової залози);
- при проявах вторинного імунодефіцитного синдрому після перенесення інфекційних захворювань;

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

– під час і після проведення цитостатичної та променевої терапії.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Артеріальна гіпотензія. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат застосовують розведеним у воді.

Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.

Препарат містить етанол і тому не слід застосовувати його при хронічних захворюваннях печінки, алкоголізмі.

Особливі застереження.***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Препарат протипоказаний у період вагітності.

На період лікування слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Під час застосування настойки слід утримуватись від керування транспортними засобами, виконання роботи, яка вимагає підвищеної уваги та швидкості психомоторних реакцій.

Діти.

Не застосовувати.

Спосіб застосування та дози.

Препарат призначають внутрішньо за 30 хв до їди.

Перед застосуванням збовтувати.

Рекомендовані дози для дорослих: від 5 мл (чайна ложка) до 15 мл (столова ложка) на прийом (за рекомендацією лікаря залежно від перебігу захворювання), розводячи в невеликій кількості води, 3 рази на добу (ранок, день, вечір).

Тривалість лікування залежить від показання для застосування, перебігу захворювання і зазвичай становить від 14 до 21 доби. Прийом настойки більш вказаного терміну визначається лікарем та проводиться за контролем динаміки показників аналізу крові. При тривалому застосуванні препарату необхідно після кожного місяця прийому препарату робити перерву на 5 - 7 днів.

Передозування.

Симптоми: можлива біль в епігастральній ділянці (зникає після коригування доз згідно з рекомендаціями); диспептичні явища (нудота, блювання), при значному передозуванні – уповільнення пульсу, запаморочення, сонливість.

Лікування: відміна препарату, симптоматична терапія.

Побічні ефекти.

З боку травного тракту: диспептичні явища (блювання, нудота, діарея, диспепсія).

З боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпотензія.

Алергічні реакції: шкірні висипи, свербіж, кропив'янка.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Етанол може незначною мірою підвищити чутливість організму до клофеліну та нейролептиків, знизити активність тіаміну.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Сторінка 3 з 3. Видаєник: Державний експертний центр МОЗ України

Препарат підсилює дію інших протизапальних та жовчовивідних засобів, а також заспокійливих та снодійних засобів, транквілізаторів, нейролептиків, антидепресантів з седативною дією, гепатопротекторів.

Термін придатності.

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Під час зберігання можливе випадання осаду, який не впливає на ефективність препарату.

Перед застосуванням збовтувати.

Упаковка.

По 100 мл у флаконах або банках, вкладених у пачки із картону.

Категорія відпуску.

Без рецепта.