

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ПЕРСЕН®
(PERSEN®)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: коричневі, круглі, двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою;

склад: 1 таблетка містить 50 мг екстракту валеріани (Extr. Valerianae), 25 мг екстракту меліси (Extr. Melissa) та 25 мг екстракту м'яти перцевої (Extr. Menthae piperitae);

допоміжні речовини: тальк, магнію стеарат, кросповідон (Polyplasdon), крохмаль маїсовий, кремнію діоксид колоїдний безводний, целюлоза мікрोकристалічна, лактози моногідрат, гідроксипропілметилцелюлоза (Hypromellose, Pharmacoat), натрію карбоксиметилцелюлоза, повідон, сахароза, кальцію карбонат, титану діоксид, барвник коричневий 75, гліцерин, віск монтангліколевий.

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні препарати. Код АТС N05CM09.

Фармакологічні властивості. Персен® є препаратом рослинного походження з м'якою седативною дією. Валеріана має седативну дію. Вона виявляє позитивний вплив при симптомах роздратованості, таких як: неспокій, збудження і напруження внаслідок нервового перенавантаження. При безсонні сприяє скорішому засинанню.

Меліса також має седативну та спазмолітичну дію.

М'ята перцева традиційно застосовується у поєднанні з валеріаною у заспокійливих препаратах.

Персен® застосовують при неврозах, коли прийом сильнодіючих заспокійливих засобів недоцільний.

Показання для застосування. Персен® призначають при неврозах, що супроводжуються такими симптомами:

- нервове збудження;
- неспокій;
- зниження концентрації уваги;
- розлади сну.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі і діти від 12 років: при нервозності 2 – 3 таблетки 2 – 3 рази на добу.

При безсонні 2 – 3 таблетки за годину до сну.

Діти від 3 до 12 років: прийом тільки під наглядом лікаря. Дозу слід підбирати відповідно до маси тіла (1 таблетка 1 – 3 рази на добу).

Термін лікування необмежений. Навіть при тривалому застосуванні таблеток або капсул звикання не спостерігається.

Після припинення лікування абстинентного синдрому не відмічалось.

Побічна дія. Можливі реакції підвищеної чутливості.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Не призначають дітям до 3-х років.

Передозування. Токсичної дії препарату не відмічено. Одноразовий прийом приблизно 60 таблеток може спричинити появу таких симптомів, як втомленість, спазм у черевній порожнині, неспокій, запаморочення, тремор рук і розширення зіниць. Ці симптоми зникають протягом 24 годин.

Особливості застосування.

Застосування в періоді вагітності та лактації. Негативної дії ліків не відмічено. Як і у випадку застосування ліків взагалі, особливої обережності слід дотримуватись у першому триместрі вагітності та під час грудного вигодовування, тому рішення про застосування препарату повинен прийняти лікар.

Вплив на психофізичну здатність. У рекомендованих дозах препарат не впливає на здатність керувати автомобілем і механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. **Не відома.**

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище 25°C.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Термін придатності - 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. 4 блістери по 10 таблеток, вкритих оболонкою, в картонній упаковці.

Виробник. Лек фармацевтична компанія д.д.

Адреса. Веровшкова 57, Любляна, Словенія.