

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ОБЛІПІХОВА ОЛІЯ**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* олія обліпихова;

1 супозиторій містить олії обліпихової 500 мг;

*допоміжна речовина:* основа для виготовлення супозиторіїв (напівсинтетичні гліцериди).

**Лікарська форма.** Супозиторії ректальні.

Від світло-жовтого до темно-помаранчевого кольору супозиторії циліндричної форми, з матовою та/або глянцевою поверхнею. На зрізі допускається наявність повітряного та пористого стрижня та воронкоподібного заглиблення.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

FARMAPRIM SRL.

ФАРМАПРИМ СРЛ.

MD-2028, г. Кішінеу, вул. Г. Тудор, 3, Республіка Молдова.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси.

Код АТС А16А Х.

Препарат чинить протизапальну, репаративну (ранозагоювальну) дію, обумовлену мембраностабілізуючим і антиоксидантним ефектами олії обліпихової.

При введенні супозиторія в пряму кишку ефект препарату проявляється через 15 - 90 хв. Тривалість резорбційної дії алкалоїдів коливається від 2 до 6 годин.

**Показання для застосування.**

У проктології – при хронічних захворюваннях прямої кишки, геморої, колітах.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Запальні захворювання підшлункової залози, жовчнокам'яна хвороба. Дитячий вік до 6 років.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності та годування груддю препарат призначають тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

**Діти.**

Дітям віком до 6 років препарат не призначають.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовують ректально. Дорослим та дітям старше 12 років – по 1 супозиторію 1 - 3 рази на добу протягом 7 - 10 діб.

Дітям віком від 6 до 12 років – по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом 7 - 10 діб.

**Передозування.**

Даних про передозування немає.

**Побічні ефекти.**

Не встановлені. Можливі реакції підвищеної чутливості до компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не встановлена.

**Термін придатності.**

2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі 15 - 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

Супозиторії по 500 мг № 10 (5 - 2).

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.