

## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

### АРБІДОЛ®

#### Склад лікарського засобу:

*діюча речовина:* 1 таблетка містить метилфенілтіометил-диметиламінометил-гідроксиброміндолу карбонової кислоти етилового ефіру (арбідолу) 50 мг та 100 мг;

*допоміжні речовини:*

*ядро:* крохмаль картопляний, мікрокристалічна целюлоза, повідон (колідон 30), кальцію стеарат, кроскармелоза натрія (примелоза);

*оболонка:* гіпромелоза (гідроксипропілметилцелюлоза) (Е 464), титану діоксид (Е 171), макрогол 4000 (поліетиленгліколь 4000), полісорбат 80 (Е 433).

**Лікарська форма.** Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Від білого до білого з кремовим відтінком кольору, круглі, двоопуклі. На зломі від білого до білого із зеленувато-жовтим або кремовим відтінком кольору.

#### Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ „Фармстандарт-Томськхімфарм”.

634009, Російська Федерація, м. Томськ, проспект Леніна, 211.

**Фармакотерапевтична група.** Протівірусний та імуностимулюючий засіб.

Код АТС L03AX.

Протівірусний засіб з імуномодулюючою та протигрипозною дією, що специфічно подавляє віруси грипу А та В, та інших ГРВІ. Запобігає контакту та проникненню вірусів у клітини, подавляючи злиття ліпідної оболонки з мембранами клітин. Проявляє інтерфероніндукуючу дію, стимулює гуморальні та клітинні реакції імунітету, фагоцитарну функцію макрофагів, підвищує стійкість організму до вірусних інфекцій. Знижує частоту розвитку ускладнень, що пов'язані з вірусною інфекцією, а також випадків загострення хронічних захворювань.

Терапевтична ефективність при вірусних інфекціях проявляється в зниженні загальної інтоксикації та клітинних проявів захворювання, скорочується тривалість захворювання.

Лікарський засіб відноситься до малотоксичних препаратів, не має негативного впливу на організм людини при застосуванні в рекомендованих дозах.

Препарат швидко всмоктується у травному тракті. Максимальна концентрація досягається через 1,2 години після прийому в дозі 0,05 г, через 1,5 години – після прийому в дозі 0,1 г. період напіввиведення становить 17-21 годину. Приблизно 40% препарату виводиться в незміненому вигляді: з фекаліями (38,9 %) та із сечею (0,12 %). Протягом першої доби виводиться 90 % від уведеної дози.

#### Показання для застосування.

Профілактика та лікування у дорослих і дітей:

- грипу А, і В, гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі ускладненим бронхітом, пневмонією;
- комплексна терапія хронічного бронхіту, пневмонії і рецидивуючої герпетичної інфекції.

Комплексна терапія гострих кишкових інфекцій ротавірусної етіології у дітей віком від 2 років.

#### Протипоказання.

Підвищена чутливість до препарату, дитячий вік до 2 років.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.** Відсутні.

Інструкцію завантажено з сайту [www.dovgolit.com](http://www.dovgolit.com)

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Застосовується.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не впливає.

*Діти.* Препарат застосовується у дітей з 2-річного віку.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовують дітям від 2 років і дорослим.

Приймають внутрішньо за 30 хвилин до прийому їжі. Разова доза складає: діти віком від 2 до 6 років – 50 мг, діти віком від 6 до 12 років – 100 мг, діти віком від 12 років і дорослі – 200 мг (2 таблетки по 100 мг або 4 таблетки по 50 мг).

**Для неспецифічної профілактики:**

- *при безпосередньому контакті із хворими грипом та іншими ГРВІ:*

діти віком від 2 до 6 років – 50 мг, діти віком від 6 до 12 років – 100 мг, діти віком від 12 років і дорослі – 200 мг 1 раз на день протягом 10-14 днів;

- *в період епідемії грипу та інших ГРВІ, для попередження (запобігання) ускладнень хронічного бронхіту, рецидиву герпетичної інфекції:*

діти віком від 2 до 6 років – 50 мг, діти віком від 6 до 12 років – 100 мг, діти віком від 12 років і дорослі – 200 мг 2 рази на тиждень протягом 3 тижнів;

**Для лікування:**

- *грип, інші ГРВІ без ускладнень:*

діти віком від 2 до 6 років – 50 мг, діти віком від 6 до 12 років – 100 мг, діти віком від 12 років і дорослі – 200 мг 4 рази на добу (кожні 6 годин) протягом 5 днів;

- *грип, інші ГРВІ з ускладненнями (бронхіт, пневмонія та інші):*

діти віком від 2 до 6 років – 50 мг, діти віком від 6 до 12 років – 100 мг, діти віком від 12 років і дорослі – 200 мг 4 рази на добу (кожні 6 годин) протягом 5 днів, потім разову дозу 1 раз на тиждень протягом 4 тижнів.

**В комплексному лікуванні хронічного бронхіту, герпетичної інфекції:**

діти віком від 2 до 6 років – 50 мг, діти віком від 6 до 12 років – 100 мг, діти віком від 12 років і дорослі – 200 мг 4 рази на день (кожні 6 годин) протягом 5-7 днів, потім разову дозу 2 рази на тиждень протягом 4 тижнів.

**Комплексна терапія гострих кишкових інфекцій ротавірусної етіології у дітей віком від 2 років:**

діти віком від 2 до 6 років – 50 мг, діти віком від 6 до 12 років – 100 мг, діти віком від 12 років і дорослі – 200 мг 4 рази на день (кожні 6 годин) протягом 5 днів.

**Передозування.**

Не відмічене.

**Побічні ефекти.**

Рідко - алергічні реакції.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші форми взаємодії.**

При взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами негативних ефектів виявлено не було.

**Термін придатності.** 2 роки.

Не застосовувати після дати, зазначеної на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Сторінка 3 з 3. Видавник: Державний експертний центр МОЗ України

**Упаковка.** Таблетки №10 у блістері. Один блістер в картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.