

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

РАВІСОЛ®

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 мл препарату містять настойки (1:10) одержаної з суміші лікарської рослинної сировини: пагони та листя омели білої 1,5 г, трави хвощу польового 1 г, плоди софори японської 1,5 г, насіння гіркокаштана звичайного 1,5 г, плоди глоду 2 г, квітки конюшини 1 г, трава барвінку малого 1,5 г;

допоміжна речовина: етанол 40 % (об/об).

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина жовто-коричневого кольору із приємним ароматним запахом. При зберіганні допускається випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».

Україна, 61010, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.

Фармакотерапевтична група.

Гіполіпідемічні препарати. Код АТС С10А Х.

Равісол® чинить різнобічну дію: знижує рівень загальних ліпідів крові, холестерину, тригліцеридів, β -ліпопротеїдів, покращує мозковий і коронарний кровотік, є легким натрійдіуретиком, зменшує активність судинно-рухового центру та периферичну опірність судин. Володіє антиагрегантним і гіпокоагуляційним ефектом, підвищує коефіцієнт корисної дії скорочувальної діяльності міокарда, стабілізуючи мембрани лізосом і знижуючи проникність плазма-лімфоцитарного бар'єра, чинить протизапальну дію.

Показання для застосування.

Атеросклероз, вегето-судинна дистонія (у комплексній терапії).

Головний біль, запаморочення; для поліпшення пам'яті, концентрації уваги, а також для поліпшення загального стану й працездатності людей літнього віку.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 16 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат застосовують розведеним. Перед початком прийому препарату призначають стандартну гіпохолестеринову дієту, якої варто дотримуватися й під час лікування. Перед початком, а також під час курсу лікування препаратом необхідно проводити дослідження функції печінки.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

У період вагітності і годування груддю препарат протипоказаний.

За необхідності застосування препарату годування груддю слід припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими

механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат протипоказаний дітям віком до 16 років.

Спосіб застосування і дози.

Дорослим і дітям старше 16 років препарат призначають внутрішньо. Приймають із невеликою кількістю води по 1 чайній ложці (5 мл) три рази на день за півгодини до прийому їжі. Перед застосуванням препарат необхідно збовтувати. Курс лікування – 10 тижнів.

Передозування.

Симптоми: можливі прояви прооксидантних властивостей (прискорення окислювально-відновних процесів, у тому числі перекісного окиснення ліпідів, прискорення ліпідного обміну, перетворення ферментів), що супроводжуються порушеннями структури й функції клітинних мембран і функції органів, насамперед печінки, серця і нирок.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дія Равісолу® знижується при застосуванні його з альмагелем і вентером у результаті зв'язування флавоноїдів і дубильних речовин препарату Равісол з важкими металами, що входять до складу вищевказаних препаратів.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Під час зберігання можливе випадання осаду.

Упаковка.

По 100 мл у флаконі або банці, вміщених у картонну пачку.

Категорія відпуску.

Без рецепта.