

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
НІТТИФОР
(NITTYFOR®)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: permethrin; (3-феноксифеніл)метиловий ефір 3(2,2-дихлоретеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбонвої кислоти; суміш цис- і трансізомерів (1/3);

основні фізико-хімічні властивості: чистий розчин жовтого кольору, з приємним запахом;

склад: 10 мл розчину містять 50 мг перметрину;

допоміжні речовини: олія рицинова, ароматизатор, стероєнол, спирт етиловий 96%, спирт ізопропіловий, вода дистильована.

Форма випуску. Розчин для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Засоби проти ектопаразитів. Код АТС Р03А С04.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Ніттифор – 0,5% водно-спиртовий розчин, який містить діючу речовину перметрин, що належить до групи синтетичних перетроїдів. Препарат має педикулїцидну дію, згубно впливає на гниди, личинки і статевозрілі форми головних і лобкових вошей. Порушує проникність натрієвих каналів мембран нервових клітин комах, гальмує процес поляризації (реполяризації) нервової клітини, що приводить до паралізуючого ефекту.

Фармакокінетика. Розчин Ніттифор - препарат для зовнішнього застосування, місцевої дії. Під час застосування не всмоктується і не потрапляє у кровообіг.

Показання для застосування. Лікування та профілактика всіх видів педикульозу.

Спосіб застосування та дози.

Головні воші. Волосся рясно зволожують нерозведеним розчином, який втирають у коріння. Після цього необхідно зачекати на повне висихання волосся (час залежить від довжини і густоти волосся). За час висихання препарат справляє свою знищувальну дію. Після чого миють теплою водою з шампунем і розчісують волосся густим гребінцем.

Ніттифор наносять із розрахунку 10 - 60 мл на одну людину, залежно від густоти і довжини волосся.

Попередження. Якщо є небезпека повторного зараження в колективі (наприклад у школі або дитячому садку), доцільно застосовувати препарат після миття волосся і залишати на волоссі після висихання. Нанесений на волосся препарат зберігає свою активність приблизно протягом 2 тижнів, чим сприяє знищенню вошей, запобігаючи тим самим їх розмноженню. Таке оброблення волосся можна повторювати декілька разів. Мертві гниди видаляють з волосся густим гребенем або по одній, оскільки вони міцно прикріплені до волосся.

Препарат можна застосовувати дітям від 3 років.

При ураженні площццями.

Лобкове волосся рясно змочують нерозведеним препаратом і чекають на повне висихання волосся. За час висихання гинуть всі площци і гниди. Після чого препарат змивають під час купання.

Побічна дія. Алергічна реакція у вигляді шкірних висипань.

Місцеві реакції: печіння, поколювання, отерплість, посилений свербіж, еритема.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Вагітність і період лактації. Діти до 3 років.

Передозування. Не відомо.

Особливості застосування. Оброблення Ніттифором проводять у добре провітрянваному приміщенні або на відкритому повітрі. Під час оброблення Ніттифором потрібно запобігати потраплянню препарату на слизові оболонки очей, носу, ротової порожнини. Під час оброблення препаратом очі, анальний отвір і слизові оболонки статевих органів захистити ватним тампоном. У випадку потрапляння препарату на слизові оболонки їх потрібно промити проточною водою. Після оброблення необхідно вмити руки.

Вагітність і лактація.

У ці періоди препарат можна застосовувати, якщо очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода і дитини.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла та прохолодному місці. Термін придатності - 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 60 мл розчину у флаконі з полімерного матеріалу, у картонній коробці.

Виробник. АТ Фармацевтичний завод ТЕВА.

Адреса. 4042, Дебрецен, вул. Паллагі, 13, Угорщина.