

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА
(TINCTURA MENTHAE PIPERITAE)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки листя м'яти перцевої (1 : 20) 25 мл
м'яти перцевої олії 5 %;
допоміжна речовина: етанол 90 %.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина зеленого кольору із запахом і смаком м'яти перцевої. У процесі зберігання можливе випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика».
Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16.

Фармакотерапевтична група.

Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Код АТС А04 АD20**.

Олія м'яти перцевої (містить до 70 % ментолу та його ефірів) та інші біологічно активні речовини, що містяться в листі м'яти перцевої (кетон-ментон, олеанолова та урсолова кислоти, флавоноїдні глікозиди), стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлексорним шляхом зменшують відчуття нудоти і запобігають блюванню, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.

Показання для застосування.

Нудота, блювання, розлади травлення, стенокардія, невралгічні болі.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма і спазмофілія. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Відсутні.

Особливі застереження.**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

М'яти перцевої настойка містить спирт етиловий, тому препарат не застосовують у період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Через вміст у препараті спирту етилового слід утриматись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти.

Не рекомендується застосовувати М'яти перцевої настойку дітям віком до 12 років, оскільки до складу препарату входить спирт етиловий.

Спосіб застосування та дози.

Препарат приймають внутрішньо до їди. Дорослим і дітям старше 12 років призначають по 10 - 15 крапель настойки 3 - 4 рази на день. Тривалість лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (почервоніння шкіри, висипи, свербіж).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлена.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі 8 - 15 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.