

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
БРОНХОСТОП СИРОП

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: тим'яну трави екстракт сухий, сироп алтейного кореня ;

15 мл сиропу містять 0,12 г тим'яну трави екстракту сухого (7-13:1), 3,4 г сиропу алтейного кореня ;

допоміжні речовини: сок малини, ксиліт, мальтодекстрин, акація, ксантанова камедь, кислота лимонна, моногідрат, метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), ароматизатор малини, вода очищена.

Лікарська форма. Сироп.

Сироп темно-коричневого кольору з характерним запахом чебрецю.

Назва і місцезнаходження виробника.

Metochem Pharma GmbH, Jochen-Rindt-Straße 23, 1230 Vienna, Austria; Kwizda Pharma GmbH-1160 Vienna, Effingergasse 21, Austria

Метохем Фарма ГмбХ, Йохен-Ріндт-Страбе 23, 1230 Відень, Австрія; Квізда Фарма ГмбХ – 1160 Відень, Еффінгергассе 21, Австрія.

Фармакотерапевтична група. Комбіновані препарати, що застосовуються у разі кашлю та застудних захворювань. Код АТС R05X.

Рослинні компоненти (трава чебрецю та корінь алтеї), що входять до складу препарату, належать до традиційних рослинних медичних засобів, що застосовуються як відхаркувальні засоби у разі кашлю, пов'язаного із застудою, переважно при довготривалій терапії. Ефірні масла та флавоноїди трави чебрецю чинять бронхолітичну, секретолітичну та антибактеріальну дію, таким чином сприяють швидкому розчиненню мокротиння, що накопичилось у дихальних шляхах, зменшують кашель, полегшують дихання.

До складу кореня алтеї входять слизові речовини, що належать до полісахаридів, які чинять пом'якшувальну, протизапальну та обволікаючу дію і застосовуються як засоби лікування запальних захворювань дихальних шляхів.

Натуральна основа (камедь) сприяє повільному вивільненню діючої речовини, що зумовлює поступове зупинення виділення секрету слизовими оболонками, завдяки чому зменшується подразнення слизових оболонок і зупиняється кашель. Швидко і протягом тривалого часу захищає рецептори слизової оболонки дихальних шляхів від подразнення.

Флавоноїди трави чебрецю (апігенін, лютеолін) розщеплюються кишковою мікрофлорою і добре всмоктуються. Виводяться з організму переважно із сечею у незміненому вигляді або у вигляді метаболітів.

Завдяки вмісту сахарину ксиліту досягається м'який ефект. Препарат не містить цукру та спирту, тому його можна призначати дітям та хворим на діабет. Також можна приймати на ніч без шкоди для зубів.

Показання для застосування.

Захворювання дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем та виділенням густого мокротиння, пов'язане з простудою.

Як засіб для полегшення сухого кашлю та пом'якшення подразнювальної дії слизової оболонки рота та глотки.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату, а також до інших видів сімейства *Lamiaceae*.

Особливі застереження.***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Безпечність при застосуванні в період вагітності або годування груддю не встановлена.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Застосовують дітям старше 1 року.

Спосіб застосування та дози.

Дітям віком від 1 до 4 років призначають 5 мл кожні 3-4 години (4-6 разів на добу);

дітям віком від 4 до 12 років - 7,5 мл кожні 3-4 години (4-6 разів на добу);

дітям віком від 12 років та дорослим - 15 мл кожні 3-4 години (4-6 разів на добу).

Мірний стаканчик, який знаходиться в коробці, забезпечує зручніше застосування та більш точне відмірювання відповідно до рекомендованої дози.

Якщо симптоми погіршуються або очікуваний ефект не досягнуто протягом 7 днів, слід одразу звернутись до лікаря.

Для дітей рекомендується звернутись до лікаря, якщо очікуваний результат не досягнуто протягом 5 днів.

БРОНХОСТОП СИРОП можна також вживати після розведення у воді або у теплому чаї.

Передозування.

Відсутні відомості щодо випадків передозування.

При випадковому передозуванні слід звернутись до лікаря. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

При застосуванні препаратів, які містять чебрець, спостерігалися реакції підвищеної чутливості, включаючи випадок анафілактичного шоку і набряку Квінке, нудота.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлена.

Термін придатності.

3 роки.

Після відкриття флакона препарат необхідно використати протягом одного місяця.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Флакон з коричневого скла по 120 мл у картонній коробці в комплекті з дозованою ложкою.

Категорія відпуску. Без рецепта.